

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

GRANDES CULTURES SEMENCES

45M - 6 juin 1990

LUZERNE A GRAINES - N° 4

(en collaboration avec la FNAMS et les
SUADS de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

TORDEUSES :

CAPTURES MASSIVES EN ZONES CÔTIÈRES PRÉCOCES
TRAITEMENT À PRÉVOIR

TYCHIVUS-PUNAISES :

À SURVEILLER, SEUILS QUELQUEFOIS DÉPASSÉS

En zones précoces côtières les parcelles non précoupées sont généralement au stade gousses vertes sensibles à ces trois principaux ravageurs des jeunes gousses.


TORDEUSES : le seuil de 30-35 captures est souvent très largement dépassé en de nombreux endroits (Basse Vallée de l'Hérault, Biterrois, Narbonnais) depuis la dernière décennie de mai.

TRAITEZ

1/ Zones précoces côtières : dès réception à l'aide d'une spécialité (Azophène - Zolone) contenant de la phosalone à 1000 g de m.a./ha de préférence en soirée en l'absence de pollinisateurs.

2/ Zones tardives : Ouest-audoise et Nord-gardoise, un prochain avis fera le point de la situation.

3 à 5 stries noires
du bord costal



Adulte de tordeuse
couleur gris brunâtre

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42




RENFORCER LEUR SURVEILLANCE



Adulte de tychius

longueur 2,5 mm, couleur
verdâtre (seuil d'intervention :
25 en 5x5 coups de F.F.)



larve
(3 mm)



adulte
(5 à 7 mm)

Punaise MIRIDE

(Seuil d'intervention :
50 en 5x5 coups de F.F.)

Contre les punaises, préférez une spécialité contenant de l'endosulfan (1000 g de m.a./ha)

MAÏS : SESAMIE

- * INTENSIFICATION LOCALE DU VOL
- * DEGATS OBSERVES
- * POURSUIVRE LA SURVEILLANCE

Les captures se sont renforcées localement fin mai-début juin avec observations de dégâts bien visibles (région de Béziers, Clairac, Agde).

- Par ailleurs (notamment dans la plaine de Nîmes) l'essentiel du vol a été enregistré dans la 2ème quinzaine de mai, début juin.

- Préconisations : voir le précédent bulletin, en tenant compte de la date d'un éventuel premier traitement.

Produits utilisables : DIMILIN (0,5 kg/ha), DECIS CE (0,4 l/ha), SUMICIDIN 10 (0,75 l/ha).

MAÏS - SOJA - TOURNESOL ACARIENS

- * HIVER DOUX - PRINTEMPS CHAUD ET SEC
RISQUE POTENTIEL ELEVE
- * NOTE COMMUNE AGPM-INRA-SPV

- Comme en 1989, les caractéristiques climatiques de ce début d'année ont été jusqu'à présent favorables au maintien de l'activité hivernale des Tetranyques (acariens "jaunes") et à leur multiplication printanière. Les risques d'envahissement de ces cultures sont donc importants.

- Préconisation :

- * limitez le développement des foyers de ces ravageurs, en traitant essentiellement les bordures, l'invasion des parcelles se faisant surtout à partir de la végétation spontanée environnante.
- * globalement la note "acariens sur maïs" est "extrapolable" sur soja et tournesol.